



**МИНИСТЕРСТВО
труда и социальной защиты
населения**

Забайкальского края

Курнатовского ул., д. 7, г. Чита, 672000
тел.: (302-2) 35-50-85
факс: (302-2) 35-65-37
pochta@minsz.e-zab.ru
ИНН/КПП 7536095590/753601001
ОГРН 1087536008438; ОКАТО 76401373000

**Директорам
государственных учреждений
социального обслуживания
Забайкальского края**

«14» августа 2018г. № 13/13194

В связи с выявлением в краевой столице случаев кори необходимо усилить мероприятия по предупреждению заболевания. Все заболевшие не были привиты от кори по религиозным соображениям.

Единственной надежной защитой от заболевания является вакцинация, которая включена в Национальный календарь прививок. По показаниям вакцинация также необходима всем контактировавшим с больным корью, у которых нет достоверных сведений о сделанной прививке или перенесенной в прошлом кори. Вакцины против кори создают надежный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет.

Медицинским специалистам учреждений проверить привитость сотрудников и клиентов от кори, при отсутствии информации о прививке от кори подать списки на проведение вакцинации в территориальные медицинские организации.

Корь — опасная вирусная инфекция, с крайне высокой летальностью и заразностью. Вирус может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов — одновременно заболевают дети, проживающие на разных этажах дома. Период от контакта с больным корью и до проявления первых признаков болезни длится 1-2 недели.

Заболевание начинается с выраженной головной боли, слабости, повышения температуры до 40 градусов. Потом появляется насморк, кашель, аппетит пропадает. Очень характерно для кори появление конъюнктивита. Эти симптомы беспокоят 2-4 дня.

Затем появляется сыпь, которая выглядит как мелкие красные пятнышки различных размеров со склонностью к слиянию. Сыпь возникает на лице и голове, особенно характерно её появление за ушами, и распространяется по всему телу.

Лечить ее необходимо в стационаре, под неусыпным контролем медицинских работников.

При подозрении на заболевание изолировать заболевшего и срочно обратиться за медицинской помощью (вызвать врача или скорую помощь).

Чаще мыть руки водой с мылом или использовать спиртосодержащие средства для очистки рук и средства защиты органов дыхания (например, маску или марлевую повязку).

Организовать информирование клиентов и сотрудников учреждения по вопросам профилактики кори.

Проводить постоянный контроль по организации питьевого режима в учреждении и своевременно исследовать питьевую воду в соответствии плана производственного контроля учреждения.

И.о. министра

Е.О.Казаченко

Зимина Наталья Ивановна
8 (3022) 35-04-58